



a formazione a distanza per medici, odontoiatri, infermieri e infermieri pediatrici

Iniziato	martedì, 5 novembre 2024, 12:50
Stato	Completato
Terminato	martedì, 5 novembre 2024, 12:54
Tempo impiegato	3 min. 59 secondi
Punteggio	5,00/5,00
Valutazione	100,00 su un massimo di 100,00
Feedback	<b>HAI SUPERATO IL QUESTIONARIO DI VALUTAZIONE ECM.</b> Ti ricordiamo che per ottenere i crediti ECM è necessario aver superato tutte le attività obbligatorie e aver compilato il questionario di gradimento. <a href="#">Torna alle attività</a>

Domanda 1

Completato

La cascata prescrittiva:

- ☐ è fondamentale per ottenere l'efficacia voluta specie negli anziani con malattie croniche
- ☐ migliora l'aderenza al trattamento e riduce il rischio di interazioni farmacologiche
- ☒ è il fenomeno per cui la somministrazione di un farmaco produce un effetto collaterale che viene scambiato per una nuova patologia con conseguente somministrazione di altri farmaci Vedi dossier L'uso dei farmaci nell'anziano
- ☐ è la principale causa di sottotrattamento nella popolazione anziana

Domanda 2

Completato

Secondo i dati AIFA sull'uso dei farmaci nella popolazione anziana, le donne:

- ☐ sono più inclini degli uomini ad assumere antibiotici
- ☐ hanno una prevalenza d'uso maggiore di farmaci genito-urinari rispetto agli uomini
- ☐ assumono meno farmaci per la terapia del dolore rispetto agli uomini
- ☒ hanno una prevalenza d'uso maggiore di farmaci per l'osteoporosi e preparati tiroidei rispetto agli uomini Vedi dossier L'uso dei farmaci nell'anziano

Domanda 3

Completato

I criteri di Beers:

- ☐ hanno valenza teorica, ma poca utilità nella pratica clinica
- ☐ consistono di 57 indicatori evidence-based di prescrizione per malattie frequenti negli anziani
- ☒ individuano i farmaci che si dovrebbero evitare negli anziani Vedi dossier L'uso dei farmaci nell'anziano
- ☐ indicano i farmaci che devono essere utilizzati nella popolazione anziana

Domanda 4

Completato

Secondo i criteri START:

- ☒ quando un farmaco è chiaramente indicato e considerato appropriato in un dato contesto tale farmaco deve essere introdotto Vedi dossier L'uso dei farmaci nell'anziano
- ☐ la somministrazione concomitante di due o più farmaci con proprietà antimuscariniche è raccomandata
- ☐ è raccomandato l'uso di corticosteroidi sistemici anziché inalatori per la terapia di mantenimento nella BPCO moderata-grave
- ☐ tutti i farmaci sono appropriati nell'anziano purché assunti alla giusta dose e durata della terapia

Domanda 5

Completato

Secondo i dati AIFA sull'uso dei farmaci nella popolazione anziana:

- ☐ nei pazienti in politerapia con più di 10 farmaci è costante la presenza di un diuretico
- ☐ il 55% degli utilizzatori assume almeno 10 principi attivi diversi
- ☐ i farmaci ipolipemizzanti sono quelli maggiormente prescritti
- ☒ i farmaci per l'apparato cardiovascolare sono quelli maggiormente prescritti Vedi dossier L'uso dei farmaci nell'anziano

◀ Caso ECM 3: Le storie di Davide, Anna e Riccardo

Vai a...

Questionario di gradimento ▶

